

► Cabinet dentaire du Dr CARROY

Chirurgien-Dentiste à Saint Germain sur Morin proche de Magny le Hongre et Bailly Romainvilliers

📍 24, Place de la Mairie 77860 Saint Germain sur Morin

☎ Tel. : +33 1 60 04 57 89

🌐 dr-carroy-frederic.chirurgiens-dentistes.fr

Précautions à prendre pour un comblement de sinus

Si l'os au niveau du plancher sinusien montre une épaisseur insuffisante pour placer un implant, un comblement de sinus sera réalisé.

Le volume osseux disponible pour placer les implants est évalué grâce à des techniques d'imagerie en 3D qui quantifient la hauteur et l'épaisseur d'os disponibles dans la zone à implanter.

En cas d'insuffisance l'intervention est alors proposée.

Lors de la mise en place d'implants dentaires au niveau des molaires supérieures, le chirurgien est souvent confronté à un manque de volume osseux.

“ Lors de la mise en place d'implants dentaires au niveau des molaires supérieures, le chirurgien est souvent confronté à un manque de volume osseux. ”



RECOMMANDATIONS AVANT L'INTERVENTION

- > Le bilan de santé devra être mis à jour afin d'enregistrer d'éventuelles modifications depuis la dernière visite.
- > Le patient devra veiller à bien prendre le traitement préopératoire.
- > Un détartrage sera éventuellement effectué.



CONSIGNES À RESPECTER PENDANT LES JOURS SUIVANT L'OPÉRATION

- > Suivre scrupuleusement les prescriptions médicales (antalgiques, anti-inflammatoires...).
- > Appliquer pendant 48 heures une poche de glace sur la joue du côté opéré, afin de prévenir ou diminuer un éventuel œdème.
- > Privilégier une alimentation tiède pendant les 8 jours après l'opération.
- > Ne pas faire de sport ou d'excès jusqu'au retrait des fils. Éviter notamment de faire de la plongée sous-marine ou certaines activités comme jouer d'un instrument à vent.
- > Ne pas voyager en avion.
- > Dormir la tête légèrement surélevée durant les jours qui suivent l'intervention.
- > Éternuer la bouche ouverte après l'intervention, et en aucun cas se moucher.

QUE FAIRE EN CAS DE SAIGNEMENT OU D'ŒDÈME ?

- > Un saignement de nez est possible. Pour le maîtriser, il faut utiliser des tampons spécifiques disponibles en pharmacie. De plus, il est nécessaire se rincer les narines avec du sérum physiologique.
- > Un œdème et un hématome peuvent apparaître du côté opéré quelques jours après l'intervention. Cette réaction est normale, aussi n'hésitez pas à prolonger l'utilisation de la poche de glace.

À SAVOIR

En cas de saignement ou d'écoulement anormal par le nez ou la bouche, prenez contact avec votre chirurgien-dentiste.

Une visite de contrôle à quinze jours sera prévue.

